CONFIDOR 70 WG

Formulación: Gránulos humectables

Modo y Mecanismo de Acción:
Confidor 70 WG, actúa en forma sistémica, por ingestión y por contacto. En la planta el producto tiene un efecto sistémico acropetal. Imidacloprid, ubica en el lugar de recepción que le corresponde al neurotransmisor ACHE, causando la apertura continua de iones de sodio sobrecargando el sistema nervioso del insecto. El insecto muere por la pérdida de energía debido a la excitación continua.

Categoría/Banda toxocológica: 4/azul

Grupo Químico: Neonicotinoid

¿QUÉ ES?:
CONFIDOR 70 WG es un insecticida sistémico que pertenece a la familia de los Cloronicotinilos o Neonicotinoides con excelente eficacia sobre los principales insectos chupadores y plagas del suelo.

¿CÓMO TRABAJA?:
Actúa en forma sistémica, por ingestión y por contacto. En la planta el producto tiene un efecto sistémico acropetal. Imidacloprid, ubica en el lugar de recepción que le corresponde al neurotransmisor ACHE, causando la apertura continua de iones de sodio sobrecargando el sistema nervioso del insecto. El insecto muere por la pérdida de energía debido a la excitación continua.

BENEFICIOS:
- Confianza de la marca (producto reconocido)
- Eficaz contra mosca blanca e insectos chupadores.
- Con efecto tonificante para los cultivos por su fórmula anti estrés.

Indicaciones de Uso:

Confidor 70 WG debe ser aplicado con equipo terrestre en drench al cuello de la planta o alrededor del pseudotallo con aspersora de mochila sin boquilla. Este producto también puede ser aplicado mediante riego por goteo. Para aplicaciones foliares utilizar mochila de espalda con boquilla de cono hueco. Antes de utilizar el equipo se debe verificar que se encuentra en buen estado de funcionamiento, sin fugas y con la calibración correcta.
Vierta la mitad de agua en la aspersora o tanque mezclador. Luego agregue la dosis recomendada de **Confidor 70 WG**. Para un óptimo desempeño del producto el pH del agua debe oscilar entre 6.5 y 8. Agregue agua hasta completar la cantidad requerida. AGITE BIEN LA MEZCLA y proceda a realizar la aplicación. Asegúrese de contar con el equipo necesario para cargar la aspersora o tanque mezclador y para dosificar el producto. Agitar bien, una vez realizada la aplicación se debe lavar el equipo.

PRIMEROS AUXILIOS:
EN CASO DE INGESTIÓN: No induzca el vómito. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quite la ropa contaminada, lave

inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE INHALACIÓN: Mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

TRATAMIENTO MÉDICO: Aplique tratamiento sintomático.

USOS REGISTRADOS:

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS
Tomate *Solanum lycopersicum*	Mosca Blanca *Bemisia tabaci*	500 g/ha (350 g/mz)
Chile *Capsicum* spp.	Mosca Blanca *Bemisia tabaci*	500 g/ha (350 g/mz)
Melón *Cucumis melo*	Mosca Blanca *Bemisia tabaci*	250 g/ha (175 g/mz)
Sandía *Citrullus lanatus*	Mosca Blanca *Bemisia tabaci*	250 g/ha (175 g/mz)
Ornamentales	Mosca Blanca *Bemisia tabaci*	500 g/ha (350 g/mz)
Banano y Plátano *Musa* spp.	Picudo Negro *Cosmopolites sordidus*	612 g/ha (en 1,700 plantas) (0,36 g/planta diluido en 100- 200 ml de agua)
Chayote *Sechium edule*	Mosca Blanca *Bemisia tabaci*	250 g/ha (175 g/mz)
Algodón *Gossypium hirsutum*	Mosca Blanca *Bemisia tabaci*	250-300 g/ha (175-210 g/mz)

OBSERVACIONES:

Utilizar un volumen de agua de 200-400 L/ha (140 – 280 L/mz) de acuerdo al estado fenológico del cultivo.

PRESENTACIONES DISPONIBLES:

13, 52, 85, 250 gramos y 20 kilogramos

OTRA INFORMACIÓN DEL PRODUCTO:

Clasificación IRAC

Se transloca vía xilema. Para manejo de resistencia según clasificación IRAC pertenece al grupo 4A.

Origen/No. De registro:

Alemania 4070

Lea la etiqueta y el panfleto antes de usar el producto, consulte al profesional en Ciencias Agronómicas.