



INFINITO 68,75 SC

Formulación: Suspensión Concentrada

Modo y Mecanismo de Acción:

Infinito 68,75 SC es un fungicida que tiene acción sistémica y de contacto que afecta la estructura de la célula, interrumpe la formación de proteínas que desempeñan un papel esencial en la estabilidad del citoesqueleto del patógeno, con efecto antiesporulante. Se transloca en la planta vía xilema.

Categoría/Banda toxicológica: 5/verde

Grupo Químico: Carbamato + Benzamida

¿QUÉ ES?:

INFINITO 68,75 SC, es una combinación de los principios activos Propamocarb y Fluopicolide. Es un fungicida que actúa de forma preventiva y curativa.

¿CÓMO TRABAJA?:

Debido a la característica de los componentes de INFINITO, ofrece una actividad translaminar con efecto antiesporulante, el cual el producto es redistribuido rápidamente vía xilema.

BENEFICIOS:

- Control muy efectivo de quema de papa y tomate.
- Resistente al lavado y rápida penetración en el cultivo.
- Control prolongado de la enfermedad.

Indicaciones de Uso:

Agítese bien antes de utilizar el producto. Vierta la mitad de agua y agregue la dosis recomendada de Infinito 68,75 SC, agite la mezcla. Mantenga el agitador funcionando durante las operaciones de llenar, mezclar y rociar. Asegúrese de contar con el equipo necesario para dosificar, mezclar y aplicar el producto. Para un óptimo desempeño del producto el pH del agua debe oscilar entre 5 y 7.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: No induzca el vómito. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo

con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE INHALACIÓN: Mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

TRATAMIENTO MÉDICO: Realice tratamiento sintomático y medidas de apoyo de acuerdo con los signos clínicos presentados para mantener los signos



vitales. Si se comprueba que hubo ingestión del producto realice lavado gástrico con protección de la vía aérea de ser necesario si ha transcurrido menos de 1 hora desde la ingesta del producto, hasta que el agua salga sin olor al tóxico, luego administrar carbón activado a dosis de 1 gr/kg de peso

en los adultos y 0.5 gr/kg de peso en los niños, posteriormente administrar una dosis de laxante (si no existe diarrea). Mantener una correcta hidratación por vía oral o parenteral, garantice, adecuada circulación y ventilación.

USOS REGISTRADOS:

CULTIVO	ENFERMEDADES	DOSIS	ÉPOCA DE APLICACIÓN
Papa <i>Solanum tuberosum</i>	Tizón tardío <i>Phytophthora infestans</i>	1,0 L/ha	Etapa vegetativa en presencia de la enfermedad.
Melón <i>Cucumis melo</i> Pepino <i>Cucumis sativus</i> Sandía <i>Citrullus lanatus</i>	Mildió velloso <i>Pseudoperonospora cubensis</i>	1,4 – 1,6 L/ha	Etapa vegetativa en presencia de la enfermedad.

PRESENTACIONES DISPONIBLES:

250 y 500 mL y 1 litro

OTRA INFORMACIÓN DEL PRODUCTO:

Clasificación FRAC

Para manejo de resistencia pertenece al grupo 28/43

Origen/No. De registro:

Guatemala 8702368

Lea la etiqueta y el panfleto antes de usar el producto, consulte al profesional en Ciencias Agronómicas.