



PREVALOR 84 SL

Formulación: Concentrado Soluble

Modo y Mecanismo de Acción:

Prevalor 84 SL es un fungicida sistémico que se transloca vía xilema y floema, actúa en forma preventiva y curativa, interfiriendo en el transporte de fósforo dentro de la fisiología del hongo. Además en forma indirecta estimula en la planta la síntesis de compuestos fenólicos y fitoalexinas que constituyen los componentes del sistema inmunológico de las plantas y tiene efecto antiesporulante.

Categoría/Banda toxicológica: 5/verde

Grupo Químico: Carbamato + Organophosphate

¿QUÉ ES?:

PREVALOR 84 SL es una combinación optimizada de los principios activos de Propamocarb y Fosetyl-al.

¿CÓMO TRABAJA?:

PREVALOR 84 SL, ofrece sinergismo al combinar una acción fungicida con una resistencia sistémica adquirida por la planta. El modo de acción de cada ingrediente activo en esta formulación está basado en una inhibición en múltiples sitios del metabolismo del hongo (acción multisitio).

BENEFICIOS:

Fungicida sistémico con mezcla de dos ingredientes activos.

Indicaciones de Uso:

Agregue la dosis correcta en el volumen de la mezcla a utilizar, mezcle bien y viértalo al depósito del equipo de aplicación. Al realizar la mezcla de tanque, antes de la aplicación, asegurarse de utilizar agua con un pH neutro de preferencia o en el rango de 6 a 8 y chequear que la dureza no sea mayor de 500 ppm. lavar el equipo de aplicación después de cada jornada de trabajo.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: No induzca el vómito. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:

Quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo

con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE INHALACIÓN: Mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

TRATAMIENTO MÉDICO: Aplique tratamiento sintomático.



USOS REGISTRADOS:

CULTIVO	ENFERMEDADES	ETAPA
Papa <i>Solanum tuberosum</i>	Tizón tardío <i>Phytophthora infestans</i>	Vegetativa
Melón <i>Cucumis melo</i>	Mildíu vellosa <i>Pseudoperonospora cubensis</i> Mal del talluelo <i>Pythium spp.</i>	Vegetativa

DOSIS RECOMENDADAS PARA APLICACIONES FOLIARES:

1,5 – 2 L/ha (1,0 – 1,4 L/mz)

DOSIS RECOMENDADAS DE APLICACIONES AL SUELO:

Aplicaciones en semilleros o bandejas

1,5 mL / L de agua

Recomendaciones

- Se recomienda de 2 a 3 aplicaciones hasta antes del transplante.
- Se puede mezclar con Confidor.

Aplicaciones en campo

2 – 2,5 L / ha (1,4 – 1,75 L/mz)

Recomendaciones

- Aplicaciones al suelo utilizar de 2 mL a 2,5 mL de Prevalor / L de agua.
- Aplicar directamente a la base de la planta 50 mL de la solución en dos diferentes puntos.
- Se recomienda por lo menos de 2 – 3 aplicaciones durante el desarrollo del cultivo.
- Hacer la primera aplicación al momento del transplante, es recomendable mezclarlo con Confidor. La segunda aplicación 14 días después.

Aplicaciones por riego o goteo

2 – 2,5 L / ha (1,4 – 1,75 L/mz)

Recomendaciones

- Aplicar la dosis y regar posteriormente 7-10 m³ de agua/ha para asegurar bien la cobertura del suelo.

PRESENTACIONES DISPONIBLES:

250 mL y 1 litro.

OTRA INFORMACIÓN DEL PRODUCTO:

Clasificación FRAC

Para manejo de resistencia pertenece al grupo 28/33.

Origen/No. De registro:

Alemania 8702369

Lea la etiqueta y el panfleto antes de usar el producto, consulte al profesional en Ciencias Agronómicas.